

修改日期:2026年02月28日

坤净栓说明书

K u n j i n g s h u a n

本品含咪唑吡啶，对乙酰利具有镇静作用，孕妇及哺乳期妇女禁用。

通用名称: 坤净栓

汉语拼音: Kunji

【成份】 桑寄生、杜仲、川牛膝、怀地黄、补骨脂。

【性状】本品为黄褐色至褐色鱼雷形栓剂，有弹性。

【功効】 ①治一切瘡毒。主癰疽疔，由土氣濕入生之腫痛等。其藥性仁、其味辛。

【规格】每粒重3g(含呋喃唑酮50mg)

【用法用量】阴道给药，一次1粒，一日1次，连用五至七日为一疗程。本品要求在20℃以下贮藏，如温度过高致栓粒变软、变形时，应在使用前放冰箱冷藏，凝固后继续使用，不影响疗效。

【不良反应】尚不明确。

【摘要】1. 对木药和其它硝基咪唑米药讨论老林田

2、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】本品为中西复方制剂，鉴于尚无充分的临床研究数据证实本复方制剂可以减低或消除其中化学药物对人体的不良反应，因此，本品说明书中列出了本品所含化学药物呋喃唑酮的相关内容，以提示医生和患者在使用本品时予以关注。

1、一般不宜用于溃疡病或支气管哮喘患者。

2、口服咪唑啉酮期间饮酒, 即可引起双硫仑样反应, 表现为面部潮红、皮肤发热、头痛、恶心、腹痛、心动过速、血压升高、胸闷、烦躁等, 故服药期间和停药后5天内, 禁止饮酒。

3、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6PD) 缺乏者可致溶血性贫血。

4、本品含有吡喃唑酮，以下为单独使用该化学药物时的不良反应：主要有恶心、呕吐、腹泻、头痛、头晕、药物热、皮疹、肛门瘙痒、哮喘、直立性低血压、低血糖、肺水肿等。偶可用血液溶血、黄疸及多发性神经炎。

5、本品含咪唑啉酮，以下均为该化学药物与其它药物同时使用时相互作用：

(1)与三环类抗抑郁药合用可引起急性中毒性精神病,应予避免。

(2)本品可增强左旋多巴的作用。

(3)拟六感助、空全助助、全助、全助拍制法、[https://www.bilibili.com/video/BV13t4y1g73p/](#)、[https://www.bilibili.com/video/BV13t4y1g73p/](#)

【贮藏】密封,置阴凉(不超过20℃)干燥处。

【包装】聚乙烯/低密度聚乙烯/聚丙烯/聚酯/尼龙/棉/纸/布/塑料/金属/玻璃/陶瓷/木材/其他材料

【有效期】24个月

【执行标准】国家标准GB/T 18800-2001《数字电视地面接收设备通用规范》(VCS-D-2071-00-2-2017)

【批准文号】国药准字Z20054904

【药品上市许可持有人】

名称：亚宝药业四川制药有限公司

注册地址：四川省彭州工业开发区柏江北路368号

【生产企业】

企业名称：亚宝药业四川制药有限公司

生产地址：四川省彭州工业开发区柏江北路368号。

邮政编码: 611930

电话号碼：028-83753087(質量) 83752193(銷售)

传真号码: 028-83793077

注册地：四川省彭州工业开发区柏江北街268号

网 址: <http://sczy.yabao.com.cn>